
医学教育网临床助理医师考试:《答疑周刊》2023年第39期

女性生殖系统异常分娩占到了很大的分值,考点众多,非常需要理解,今天再次通过几道产道异常的题目来回顾相应的知识点。

问题索引:

1. 初产妇临产后胎头未入盆,首先应考虑出现了什么情况?
2. 哪种胎位和骨盆狭窄可以进行试产?
3. 胎头跨耻征阳性应该如何处理?

具体解答:

1. 初产妇临产后胎头未入盆,首先应考虑

- A. 羊水过多
- B. 腹壁松弛
- C. 脑积水
- D. 头盆不称
- E. 宫缩乏力

【正确答案】 D

【答案解析】一般临产时,胎头多已入盆,如未入盆,首先考虑头盆不称(骨产道异常)。正常情况下,部分初孕妇在预产期前2周,经产妇于临产后,胎头应入盆。若已临产,胎头仍未入盆,则应充分估计头盆关系。**[医学教育网原创]**

2. 下列哪种情况可以试产

- A. 头位,骨盆入口狭窄(相对性)
- B. 头位,骨盆出口狭窄
- C. 横位,骨盆入口狭窄
- D. 臀位,骨盆入口狭窄
- E. 臀位,骨盆出口狭窄

【正确答案】 A


【答案解析】 若存在骨盆狭窄，则只有一种情况可以试产，那就是头位、胎儿不大、相对性骨盆入口平面狭窄。其它情况都是禁止试产的。[医学教育网原创]

3. 患者女性，初孕 39 周。估计胎儿 3800g，临产 10 小时入院，查宫底剑突下 1 指，左枕前位胎心好，宫缩强，宫口开大 4cm，胎头跨耻征阳性，应采取何项处理

- A. 观察经过
- B. 剖宫产术
- C. 三联注射
- D. 等待自然分娩
- E. 催产素静点

【正确答案】 B

【答案解析】 若胎头低于耻骨联合前表面，表示胎头可以入盆，头盆相称，称胎头跨耻征阴性；若胎头与耻骨联合前表面在同一平面，表示可疑头盆不称，称胎头跨耻征可疑阳性；若胎头高于耻骨联合前表面，表示头盆明显不称，称胎头跨耻征阳性。胎头不能入盆（即不能衔接），只能行剖宫产。[医学教育网原创]



正保医学教育网
www.med66.com